

III. FÓRMULAS PARA PREMATUROS

Similac® Fortificador de Leche Humana

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Fortificador de la leche humana.

CARACTERÍSTICAS:

Se recomienda como apoyo a la alimentación de la leche materna para lactantes pretérmino y/o de bajo peso al nacer. Se puede mezclar con la leche materna para obtener 22 Kcal/oz o 24 Kcal/oz.

SUGERENCIA DE USO:

Similac® Fortificador de Leche Humana está sugerido para adicionarse a la leche materna en niños con bajo peso al nacer hasta que alcancen un peso aproximado de 3,600 g o hasta que su médico lo indique.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Siga las instrucciones del médico.

Vía de administración: oral.

Dosis: la que el médico señale (se pueden hacer mezclas para obtener diferentes concentraciones de calorías 22 Kcal/oz y 24 Kcal/oz.)

- Un sobre en 50 mL de leche materna=22kcal/oz.
- Un sobre por cada 25mL de leche materna=24kcal/oz.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:

Cubra inmediatamente la leche humana fortificada preparada que no utilizó. Almacene en refrigeración y use antes de 8 horas, o de acuerdo con los procedimientos hospitalarios normales de manejo de la leche humana en un máximo de 24 horas. Almacene los sobres cerrados a temperatura ambiente, evite temperaturas extremas. No almacene los sobres una vez abiertos.

PRESENTACIONES:

Caja con 3 paquetes de 50 sobres de 0,90 g cada uno.

INGREDIENTES:

Ingredientes: Leche descremada, concentrado de proteína de suero de leche, sólidos de jarabe de maíz, MINERALES: (fosfato tribásico de calcio, citrato de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, sulfato de zinc, citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, selenato de sodio), aceite de triglicéridos de cadena media, VITAMINAS:(ácido ascórbico, m-inositol, niacinamida, acetato de d-alfa tocoferilo, pantotenato de calcio, palmitato de vitamina A, riboflavina, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, vitamina D3,biotina, ácido fólico, filoquinona, cianocobalamina), lecitina de soya. Contiene leche e ingredientes de soya. Puede contener fosfato de potasio, hidróxido de potasio, carbonato de calcio.

Información Nutricional:

Análisis Aproximado Nutrientes	Unidades	Por 100 g	Por porción de 0,9 g	Por 100 kcal	Dist. Energética
Contenido energético	kJ kcal	1 703 401	17 4	425 100	
Hidratos de Carbono	g	50,0	0,5	12,5	50 %
Proteínas	g	27,8	0,3	6,9	28 %
Lípidos	g	10,00	0,09	2,49	22 %
del cual					
Ácido Linoleico	g	1,16	0,01	0,29	
Ácido Linolénico	g	0,138	0,001	0,034	
Vitaminas					
Vitamina C (ácido ascórbico)	mg	694	6	173	
Inositol	mg	107	1	27	
Niacina	mg	99,17	0,89	24,72	
Vitamina E (eq. Tocoferoles)	mg	59,7	0,5	14,9	
Ácido Pantoténico	mg	41,7	0,4	10,4	
Vitamina B ₂ (Riboflavina)	µg	11 583	104	2 887	
Vitamina B ₁ (Tiamina)	µg	6 472	58	1 613	
Vitamina B ₆ (Piridoxina)	µg	5 861	53	1 461	
Vitamina A (eq. de Retinol)	µg	5 167	47	1 288	
Biotina	µg	722	6	180	
Ácido Fólico	µg	639	6	159	
Vitamina K	µg	230,6	2,1	57,5	
Vitamina D ₃	µg	83	1	21	
Vitamina B ₁₂ (Cobalamina)	µg	17,78	0,16	4,43	
Calcio	mg	3 250	29	810	
Fósforo	mg	1 861	17	464	
Potasio	mg	1 750	16	436	
Cloruro	mg	1 056	10	263	
Sodio	mg	417	4	104	
Magnesio	mg	194,4	1,7	48,5	
Zinc	mg	27,8	0,3	6,9	
Selenio	mg	0,0139	0,0001	0,0035	
Hierro	mg	9,72	0,09	2,42	
Cobre	µg	4 722	42	1 177	
Manganeso	µg	200,0	1,8	49,9	

